

Назва дослідження	Доклінічне in vivo дослідження спектру специфічної протипухлинної активності препарату «Трилумін»	Доклінічне вивчення алергогенної активності препарату «Трилумін»
Місце	Національний інституту раку м. Київ г. Киев	Дніпропетровська державна медична академія
Документ	Звіт 2011 року	Звіт 2011 року/
Дослідники	І.Б.Щепотін Н.М. Храновська	Г.В.Дзяк В.Й.Мамчур К.О.Сквирська Ю.В.Харченко
Дослідження та результат	карцинома легень Льюїс , - позитивний суттєва протипухлинна дія	Шкірно-подразнююча дія, місцево-подразнююча дія на слизову оболонку очей, загальна анафілаксія, метод нашкірних аплікацій, кон'юнктивальна проба, вивчення імунотоксичності - не подразнює шкіру. Не викликає змін слизової кон'юнктиви. Анафілактичного шоку не спостерігалось. Гіперемія вуха проходила через 2 доби. Відсутність алергії, безпечність в плані розвитку неалергічного контактного дерматиту. Препарат не спричиняє алергічної реакції. Препарат не має імунотоксичного ефекту. Фагоцитарна активність вірогідно збільшилась
	меланома В16 , - має протипухлинний ефект	
	саркома 37 , - Позитивний має протипухлинний ефект	
	лімфоїдна лейкемія L1210 - Негативний	